

IMPORTANCIA DE VACUNACIÓN DE INFLUENZA



IMPORTANCIA DE
VACUNACIÓN DE
INFLUENZA

IMPORTANCIA VACUNACIÓN
EN TIEMPOS COVID
POBLACIONES DE RIESGO

COADMINISTRACIÓN DE
VACUNAS COVID CON
OTRAS VACUNAS

DATOS IMPORTANTES DE
LA VACUNACIÓN DE COVID
Y OTRAS VACUNAS

RECOMENDACIONES
GENERALES DE PREVENCIÓN
DE COVID Y DE FLU

PREGUNTAS FRECUENTES
ACERCA DE
VACUNACIÓN COVID

PÁGINAS:

1

2

3

4

5

6

7

8




REFERENCIAS


SANOFI PASTEUR 

1

Las **epidemias anuales de influenza** causan entre **290.000** y **650.000** muertes estimadas en todo el mundo con una tasa de ataque anual de



5% - 10%
EN ADULTOS¹




20% - 30%
EN NIÑOS¹



2

Grupos de población específicos,

como los adultos mayores (67% de las muertes relacionadas con la influenza) y las personas con enfermedades crónicas (**por ejemplo, diabetes, enfermedades cardiovasculares**), tienen un mayor riesgo de complicaciones relacionadas con la influenza, hospitalización, exacerbación de la enfermedad subyacente y muerte.^{8,9}




3

La influenza como **COVID** es mas allá que un virus respiratorio causa complicaciones respiratorias, pero también complicaciones diabéticas, cardiovasculares, renales y neurológicas².





Organización
Mundial de la Salud



La organización mundial de la Salud (OMS) ha declarado dentro de las Guías de principios para las actividades de inmunización durante la pandemia de **COVID-19**, que la inmunización es un servicio de salud básico que debe priorizarse para la prevención de enfermedades transmisibles para la continuidad durante la pandemia de COVID-19.⁷



5

Ayudar a **proteger a las poblaciones** contra la influenza es una forma de reducir la carga para el sistema de atención médica.

Al minimizar las hospitalizaciones por influenza, permite que los equipos hospitalarios dediquen su tiempo y energía a los pacientes con COVID-19.

6

Los pacientes con influenza tienen un **mayor riesgo de mortalidad** durante una coinfección con **SARS - CoV - 2⁶**.





7

Las vacunas contra la influenza son:

SEGURAS Y EFECTIVAS^{1,3}

8




A medida que se **levanten las restricciones**, la transmisión de la influenza también **podría aumentar (actualmente alto % de Influenza B⁴)**, lo que provocaría una posible circulación conjunta de la influenza y el SARS-CoV-2 y una **carga adicional** para las poblaciones vulnerables y los sistemas de salud¹




Referencias:

1. <https://www.who.int/biologicals/vaccines/influenza/en/> 2. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7545338/> 3. https://www.who.int/immunization/policy/position_papers/Interim_SAGE_influenza_vaccination_recommendations.pdf?ua=1 4. https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/ 5. <https://scp.com.co/wp-content/uploads/2020/05/CONSENSO-LATI-NOAMERICANO-SOBRE-VACUNACIÓN-Y-SERVICIOS-DE-INMUNIZACIÓN-DURANTE-LA-PANDEMIA-COVID-19-1.pdf> 6. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmv.26740> 7. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331590/WHO-2019-nCoV-immunization_services-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 8. Paget, GLaMOR Project, 2019; DOI: 10.7189/jogh.09.020421 9 . World Health Organization. Weekly epidemiological record - Vaccines against influenza WHO position paper, 87, No. 47 p 461–476.

Material dirigido al profesional de la salud. Para mayor información comunicarse con el departamento médico, en **Bolivia, Centro América y Caribe:** Sanofi-Aventis de Panamá S.A. Torre Evolution, piso 32 Calle 50 y Av. Aquilino De La Guardia Obarrio-Ciudad de Panamá, República de Panamá Telf.: (507) 382-9500. Sitio web: <http://www.sanofi.com.pa/l/pa/sp/index.jsp>. Correo: infomed.pac@sanofi.com **En Ecuador:** Sanofi-Aventis del Ecuador S.A., Centro Corporativo Ekopark, Vía Antigua a Nayón y Av. Simón Bolívar, torre 2, piso 5, Teléfono 2500-3020. **En Venezuela:** Sanofi Aventis de Venezuela, S.A. Prolongación, calle Vargas con 2da transversal, Urb. Boleíta Norte. Edif. Sanofi, Caracas, Venezuela. Telf.:(Master) (0212) 7189000 RIF. J-30308848-1. En Colombia: TV 23 # 97 73 piso 9 – Bogotá Teléfono (57-1) 6214400. **En Perú:** Av. Javier Prado Este 444 Piso 15, San Isidro Lima-Perú Teléfono (+511) 631-9100 Para reportes de eventos adversos en: **Centro América, Caribe, Bolivia y Ecuador:** drugs.camwi@sanofi.com **Venezuela:** farmacovigilancia.ve@sanofi.com. MAT-BO-2100152 04/21.



RECOMENDACIONES DE LA IMPORTANCIA DE VACUNACIÓN **EN TIEMPOS DE COVID** EN POBLACIONES DE RIESGO



IMPORTANCIA DE
VACUNACIÓN DE
INFLUENZA

IMPORTANCIA VACUNACIÓN
EN TIEMPOS COVID
POBLACIONES DE RIESGO

COADMINISTRACIÓN DE
VACUNAS COVID CON
OTRAS VACUNAS

DATOS IMPORTANTES DE
LA VACUNACIÓN DE COVID
Y OTRAS VACUNAS

RECOMENDACIONES
GENERALES DE PREVENCIÓN
DE COVID Y DE FLU

PREGUNTAS FRECUENTES
ACERCA DE
VACUNACIÓN COVID

PÁGINAS:

1

2

3



REFERENCIAS

SANOFI PASTEUR 


SLIPE en su documento de Consenso Latinoamericano sobre vacunación y servicios de inmunización durante la pandemia recomienda que entre las vacunas para priorizar durante COVID-19 **se recomienda¹**:



Infecciones en planes de eliminación y erradicación como **sarampión, rubeola, tétanos neonatal, polio.**



Enfermedades con **alta morbimortalidad** como **Influenza** y neumococo.



Infecciones propensas a brotes como:

Influenza

Meningococo

Difteria

Sarampión

Rubeola

Polio

Fiebre amarilla

WHO SAGE recomienda la siguiente priorización de grupos de riesgo para la vacunación contra la influenza estacional durante COVID-19²



GRUPOS DE RIESGO DE **MÁXIMA PRIORIDAD**



Trabajadores de la salud



Adultos mayores



GRUPOS DE RIESGO ADICIONALES, SIN NINGÚN ORDEN EN PARTICULAR



**Personas con
problemas de salud
subyacentes**



**Mujeres
embarazadas**



**Niños
(de 6 meses a
5 años)³**

Referencias:

1. <https://scp.com.co/wp-content/uploads/2020/05/CONSENSO-LATI-NOAMERICANO-SOBRE-VACUNACIo%CC%81N-Y-SERVICIOS-DE-INMUNIZACIo%CC%81N-DURANTE-LA-PANDEMIA-COVID-19-1.pdf>
2. https://www.who.int/immunization/policy/position_papers/Interim_SAGE_influenza_vaccination_recommendations.pdf
3. [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/influenza-\(seasonal\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal))

Material dirigido al profesional de la salud. Para mayor información comunicarse con el departamento médico, en **Bolivia, Centro América y Caribe:** Sanofi-Aventis de Panamá S.A. Torre Evolution, piso 32 Calle 50 y Av. Aquilino De La Guardia Obarrio-Ciudad de Panamá, República de Panamá Telf.: (507) 382-9500. Sitio web: <http://www.sanofi.com.pa/l/pa/sp/index.jsp>. Correo: infomed.pac@sanofi.com **En Ecuador:** Sanofi-Aventis del Ecuador S.A., Centro Corporativo Ekopark, Vía Antigua a Nayón y Av. Simón Bolívar, torre 2, piso 5, Teléfono 2500-3020. **En Venezuela:** Sanofi Aventis de Venezuela, S.A. Prolongación, calle Vargas con 2da transversal, Urb. Boleíta Norte. Edif. Sanofi, Caracas, Venezuela. Telf.:(Master) (0212) 7189000 RIF. J-30308848-1. En Colombia: TV 23 # 97 73 piso 9 – Bogotá Teléfono (57-1) 6214400. **En Perú:** Av. Javier Prado Este 444 Piso 15, San Isidro Lima-Perú Teléfono (+511) 631-9100 Para reportes de eventos adversos en: **Centro América, Caribe, Bolivia y Ecuador:** drugs.camwi@sanofi.com **Venezuela:** farmacovigilancia.ve@sanofi.com. MAT-BO-2100152 04/21.



COADMINISTRACIÓN DE VACUNAS **COVID CON OTRAS VACUNAS**



Recomendaciones mundiales de tiempo de vacunación entre vacunas de COVID-19 y otras vacunas.

IMPORTANCIA DE VACUNACIÓN DE INFLUENZA

IMPORTANCIA VACUNACIÓN EN TIEMPOS COVID POBLACIONES DE RIESGO

COADMINISTRACIÓN DE VACUNAS COVID CON OTRAS VACUNAS

DATOS IMPORTANTES DE LA VACUNACIÓN DE COVID Y OTRAS VACUNAS

RECOMENDACIONES GENERALES DE PREVENCIÓN DE COVID Y DE FLU

PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE VACUNACIÓN COVID

PÁGINAS:

1


2

3

4



REFERENCIAS



SANOFI PASTEUR



Las recomendaciones de organizaciones mundiales acerca de coadministración y el tiempo que debe transcurrir entre la aplicación de vacunas COVID autorizadas y otras vacunas:



Organización
Mundial de la Salud


RECOMIENDA¹

Debe haber un intervalo mínimo de **14 días** entre la administración de esta vacuna y cualquier otra vacuna contra otras afecciones, hasta que se disponga de datos sobre la **coadministración** con otras vacunas.

La **OMS** recomienda estudios de inmunogenicidad y seguridad de la coadministración con otras vacunas, incluida la influenza, a adultos y personas mayores.



➤ Dada la falta de datos sobre la seguridad y eficacia de las vacunas de **ARNm COVID-19 administradas simultáneamente** con otras vacunas, la serie de vacunas debe administrarse de forma rutinaria sola, con un intervalo mínimo de **14 días antes o después** de la administración con cualquier otra vacuna.



➤ Sin embargo, el **ARNm COVID-19** y otras vacunas se **pueden administrar en un período más corto** en situaciones en las que se considera que los beneficios de la vacunación superan los posibles riesgos desconocidos de la vacuna.



Departamento de Salud pública de Inglaterra²



Con base en la información actual sobre las primeras vacunas COVID-19 que se están implementando, la programación ideal debería estar separada por un intervalo de **al menos 7 días para evitar la atribución incorrecta** de posibles eventos adversos.



Como las vacunas de COVID aprobadas hasta la fecha **se consideran inactivadas**, si individuos de una cohorte elegible se presentan **habiendo recibido otra vacuna** inactivada (como influenza) o viva, la vacuna contra COVID-19 aún debe considerarse.



Lo **mismo aplica** para otras vacunas vivas e inactivadas **donde la vacuna COVID-19 ha sido recibida primero** o cuando un paciente se presenta **requiriendo dos vacunas**.



En la mayoría de los casos, **se debe proceder a la vacunación** para evitar más **demoras en la protección** y evitar **el riesgo** que el paciente **no regrese** para una cita posterior.



Referencias:

1. WHO, Extraordinary meeting of the Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) - 21 January 2021;
2. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/965177/COVID-19_vaccination_programme_guidance_for_healthcare_workers_26_February_2021_v3.4.pdf

Material dirigido al profesional de la salud. Para mayor información comunicarse con el departamento médico, en **Bolivia, Centro América y Caribe:** Sanofi-Aventis de Panamá S.A. Torre Evolution, piso 32 Calle 50 y Av. Aquilino De La Guardia Obarrio-Ciudad de Panamá, República de Panamá Telf.: (507) 382-9500. Sitio web: <http://www.sanofi.com.pa/l/pa/sp/index.jsp>. Correo: infomed.pac@sanofi.com **En Ecuador:** Sanofi-Aventis del Ecuador S.A., Centro Corporativo Ekopark, Vía Antigua a Nayón y Av. Simón Bolívar, torre 2, piso 5, Teléfono 2500-3020. **En Venezuela:** Sanofi Aventis de Venezuela, S.A. Prolongación, calle Vargas con 2da transversal, Urb. Boleíta Norte. Edif. Sanofi, Caracas, Venezuela. Telf.:(Master) (0212) 7189000 RIF. J-30308848-1. En Colombia: TV 23 # 97 73 piso 9 – Bogotá Teléfono (57-1) 6214400. **En Perú:** Av. Javier Prado Este 444 Piso 15, San Isidro Lima-Perú Teléfono (+511) 631-9100 Para reportes de eventos adversos en: **Centro América, Caribe, Bolivia y Ecuador:** drugs.camwi@sanofi.com **Venezuela:** farmacovigilancia.ve@sanofi.com. MAT-BO-2100152 04/21.

DATOS IMPORTANTES DE LA VACUNACIÓN DE COVID Y OTRAS VACUNAS



IMPORTANCIA DE VACUNACIÓN DE INFLUENZA

IMPORTANCIA VACUNACIÓN EN TIEMPOS COVID POBLACIONES DE RIESGO

COADMINISTRACIÓN DE VACUNAS COVID CON OTRAS VACUNAS

DATOS IMPORTANTES DE LA VACUNACIÓN DE COVID Y OTRAS VACUNAS

RECOMENDACIONES GENERALES DE PREVENCIÓN DE COVID Y DE FLU

PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE VACUNACIÓN COVID

PÁGINAS:

1

2

3



REFERENCIAS

SANOFI PASTEUR 



Datos importantes

- **Enfermos crónicos** pueden recibir una vacuna COVID-19².
- **Las personas deben** vacunarse **independientemente** de si ya ha tenido COVID-19.²
- **OMS, CDC** recomienda un **intervalo** mínimo de **14 días** entre la administración.^{5,6}
- **Inglatera: idealmente** debería estar separado por un intervalo de **al menos 7 días**.⁷
- **OMS** recomienda a **embarazadas y profesionales de la salud en primera línea** que se vacunen contra COVID.³
- Entre las vacunas a priorizar dado su alta morbimortalidad y propensión a brotes esta **Influenza**.⁴

Datos para tener en consideración

- ❁ **Contraindicación de Vacunas COVID:** Si ha tenido una reacción alérgica grave a cualquier componente de la vacuna.²
- ❁ **Paciente contacto con COVID-19:** esperar **14 días**, si sigue **asintomático** vacunar⁴.
- ❁ **Pacientes con COVID-19** deben esperar hasta que se hayan recuperado de su enfermedad preferiblemente 4-6 semanas post infección para vacunar⁴.
- ❁ Las vacunas COVID-19 **NO son intercambiables**¹
- ❁ **No sabemos** cuánto tiempo dura la **protección** para quienes están vacunados contra COVID-19².

Referencias:

1. <https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html>
2. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html>
3. ACOG and SMFM Joint Statement on WHO Recommendations Regarding COVID-19 Vaccines and Pregnant Individuals | ACOG
4. <https://scp.com.co/wp-content/uploads/2020/05/CONSENSO-LATI-NOAMERICANO-SOBRE-VACUNACIo%CC%81N-Y-SERVICIOS-DE-INMUNIZACIo%CC%81N-DURANTE-LA-PANDEMIA-COVID-19-1.pdf>
5. WHO, Extraordinary meeting of the Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) - 21 January 2021;
6. CDC, 2020, Interim Clinical Considerations for Use of mRNA COVID-19 Vaccines Currently Authorized in the United States;
7. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/965177/COVID-19_vaccination_programme_guidance_for_healthcare_workers_26_February_2021_v3.4.pdf

Material dirigido al profesional de la salud. Para mayor información comunicarse con el departamento médico, en **Bolivia, Centro América y Caribe:** Sanofi-Aventis de Panamá S.A. Torre Evolution, piso 32 Calle 50 y Av. Aquilino De La Guardia Obarrio-Ciudad de Panamá, República de Panamá Telf.: (507) 382-9500. Sitio web: <http://www.sanofi.com.pa/l/pa/sp/index.jsp>. Correo: infomed.pac@sanofi.com **En Ecuador:** Sanofi-Aventis del Ecuador S.A., Centro Corporativo Ekopark, Vía Antigua a Nayón y Av. Simón Bolívar, torre 2, piso 5, Teléfono 2500-3020. **En Venezuela:** Sanofi Aventis de Venezuela, S.A. Prolongación, calle Vargas con 2da transversal, Urb. Boleíta Norte. Edif. Sanofi, Caracas, Venezuela. Telf.:(Master) (0212) 7189000 RIF. J-30308848-1. En Colombia: TV 23 # 97 73 piso 9 – Bogotá Teléfono (57-1) 6214400. **En Perú:** Av. Javier Prado Este 444 Piso 15, San Isidro Lima-Perú Teléfono (+511) 631-9100 Para reportes de eventos adversos en: **Centro América, Caribe, Bolivia y Ecuador:** drugs.camwi@sanofi.com **Venezuela:** farmacovigilancia.ve@sanofi.com. MAT-BO-2100152 04/21.

RECOMENDACIONES GENERALES DE PREVENCIÓN DE COVID Y DE FLU



IMPORTANCIA DE
VACUNACIÓN DE
INFLUENZA

IMPORTANCIA VACUNACIÓN
EN TIEMPOS COVID
POBLACIONES DE RIESGO

COADMINISTRACIÓN DE
VACUNAS COVID CON
OTRAS VACUNAS

DATOS IMPORTANTES DE
LA VACUNACIÓN DE COVID
Y OTRAS VACUNAS

RECOMENDACIONES
GENERALES DE PREVENCIÓN
DE COVID Y DE FLU

PREGUNTAS FRECUENTES
ACERCA DE
VACUNACIÓN COVID

PÁGINAS:

1

2

3

4



REFERENCIAS

SANOFI PASTEUR 



SI NO ESTAS **VACUNADO**¹



- Todas las personas **mayores de 2 años** deben usar **mascarillas**.
- Manténgase al **menos a 6 pies** (aproximadamente 2 brazos) de otras personas que no vivan con usted.
- **Evite** las multitudes y los espacios mal ventilados.
- **Lávate** las manos con frecuencia.
- Cúbrase siempre la **boca y la nariz** con un pañuelo cuando tosa o estornude o use la parte interna del codo.
- **Limpie y desinfecte** las superficies que se tocan con frecuencia a diario.
- **Controle su salud** diariamente (esté atento a la fiebre, tos, dificultad para respirar).



RECOMENDACIONES

PARA PERSONAS QUE HAN COMPLETADO LA

VACUNACIÓN DE COVID



LUEGO DE RECIBIR AMBAS **DOSIS DE LA VACUNA (CDC)**²

- ✓ Puede reunirse en espacios interiores con personas **totalmente vacunadas** sin mascarilla.
- ✓ Puede reunirse en espacios interiores con personas no vacunadas de otros sin mascarilla, a **menos** que tenga **mayor riesgo** de enfermarse gravemente por COVID-19.
- ✓ Si ha estado con alguien que tiene COVID-19, no necesita mantenerse alejado de las demás personas o realizarse una prueba de detección **a menos que presente síntomas.**



RECOMENDACIONES

PARA PERSONAS QUE HAN COMPLETADO LA

VACUNACIÓN DE COVID

Debe Seguir protegiéndose y a los demás:

- Mantenerse al menos a **6 pies de distancia** de las demás personas.
- **Evitar** las multitudes y los espacios con mala ventilación.
- No Visitar a una persona no vacunada **que tiene riesgo de morir** a causa del COVID.
- **Si tiene síntomas** de COVID-19, debe realizarse una prueba de detección, quedarse en casa y mantenerse alejado de las demás personas.
- Debe **seguir postergando los viajes** nacionales e internacionales.

Referencias:

1. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html>
2. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html>

Material dirigido al profesional de la salud. Para mayor información comunicarse con el departamento médico, en **Bolivia, Centro América y Caribe:** Sanofi-Aventis de Panamá S.A. Torre Evolution, piso 32 Calle 50 y Av. Aquilino De La Guardia Obarrio-Ciudad de Panamá, República de Panamá Telf.: (507) 382-9500. Sitio web: <http://www.sanofi.com.pa/l/pa/sp/index.jsp>. Correo: infomed.pac@sanofi.com **En Ecuador:** Sanofi-Aventis del Ecuador S.A., Centro Corporativo Ekopark, Vía Antigua a Nayón y Av. Simón Bolívar, torre 2, piso 5, Teléfono 2500-3020. **En Venezuela:** Sanofi Aventis de Venezuela, S.A. Prolongación, calle Vargas con 2da transversal, Urb. Boleíta Norte. Edif. Sanofi, Caracas, Venezuela. Telf.:(Master) (0212) 7189000 RIF. J-30308848-1. En Colombia: TV 23 # 97 73 piso 9 – Bogotá Teléfono (57-1) 6214400. **En Perú:** Av. Javier Prado Este 444 Piso 15, San Isidro Lima-Perú Teléfono (+511) 631-9100 Para reportes de eventos adversos en: **Centro América, Caribe, Bolivia y Ecuador:** drugs.camwi@sanofi.com **Venezuela:** farmacovigilancia.ve@sanofi.com. MAT-BO-2100152 04/21.



PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE VACUNACIÓN COVID

IMPORTANCIA DE
VACUNACIÓN DE
INFLUENZA

IMPORTANCIA VACUNACIÓN
EN TIEMPOS COVID
POBLACIONES DE RIESGO

COADMINISTRACIÓN DE
VACUNAS COVID CON
OTRAS VACUNAS

DATOS IMPORTANTES DE
LA VACUNACIÓN DE COVID
Y OTRAS VACUNAS

RECOMENDACIONES
GENERALES DE PREVENCIÓN
DE COVID Y DE FLU

PREGUNTAS FRECUENTES
ACERCA DE
VACUNACIÓN COVID

PÁGINAS:

1

2

3

4

5

6

7

8



REFERENCIAS

SANOFI PASTEUR



1 | **¿Cómo se sincronizará la campaña de vacunación COVID-19 con las campañas anuales de influenza?**²

La OPS / OMS recomienda que las vacunas COVID-19 no se administren al mismo tiempo que otras vacunas, incluidas las vacunas contra la influenza. Deben estar separados por un período de al menos 14 días. Esta recomendación puede cambiar a medida que haya más evidencia disponible.

Todos los países deben continuar con los programas de inmunización de rutina durante la pandemia, incluida la vacunación contra la influenza en los países que han introducido esta vacuna, especialmente en las poblaciones en riesgo.





2 | ¿Quiénes podrían ser los grupos prioritarios para vacunarse contra COVID-19 cuando haya una vacuna disponible? ²

La OMS y su Grupo Asesor Estratégico sobre Inmunizaciones (SAGE) han publicado las recomendaciones con respecto a los grupos prioritarios. Estos grupos prioritarios pueden incluir trabajadores esenciales, incluidos los trabajadores de atención médica de primera línea, así como adultos mayores y adultos con afecciones de salud subyacentes. Sin embargo, cada país deberá adaptar esas recomendaciones a su contexto.²



3 | ¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes?¹


Después de vacunarse, es posible que experimente efectos secundarios, los cuales son signos normales de que su organismo está generando protección. Los efectos secundarios comunes son dolor, enrojecimiento e hinchazón en el brazo donde recibió la vacuna inyectable, además de cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, fiebre o náuseas y malestar. Estos efectos secundarios generalmente son transitorios y desaparecen a los pocos días.





4 | ¿Pueden las personas con afecciones subyacentes vacunarse contra COVID-19?²

Las vacunas COVID-19 disponibles son seguras y efectivas en personas con afecciones médicas conocidas asociadas con un mayor riesgo de enfermedades graves, como hipertensión, diabetes, asma, enfermedades pulmonares, hepáticas o renales, así como infecciones crónicas estables y controladas. Aunque se requieren más estudios para personas inmunodeprimidas, las personas en esta categoría que forman parte de un grupo recomendado para la vacunación pueden vacunarse después de recibir información y asesoramiento.



5 | **¿Cuántas dosis debe recibir de la vacuna?**¹


La cantidad de dosis necesaria depende de la vacuna que reciba. Para obtener una protección óptima verificar el inserto de cada vacuna.


6 | **¿Qué vacuna debo ponerme? ¿Cuál es el mejor?**²

La OPS alienta a las personas a vacunarse contra COVID-19 con la vacuna que les ofrezcan las autoridades nacionales de salud cuando sean elegibles.

7 | **¿Los niños pueden ser vacunados contra COVID 19?**²

Hasta enero 2021 no hay vacunas de COVID aprobadas para uso en personas menores de 18 años.





8 | ¿Puedo ser vacunado contra COVID-19 mientras este enfermo de COVID?¹

No, las personas con enfermedad de COVID que tienen síntomas deben esperar para ser vacunados hasta que estén recuperados de su enfermedad y cumplan los criterios de aislamiento. Los paciente asintomáticos deben esperar hasta que cumplan los criterios de aislamiento antes de ser vacunados.



9

Si alguien recibe la vacuna COVID-19, ¿debería esperar para recibir otras vacunas? ¹

Dada la falta de datos sobre la seguridad y eficacia de las vacunas de ARNm COVID-19 administradas simultáneamente con otras vacunas, la serie de vacunas debe administrarse sola, con un intervalo mínimo de 14 días antes o después de la administración con cualquier otra vacuna. Si las vacunas de ARNm COVID-19 se administran inadvertidamente dentro de los 14 días posteriores a otra vacuna, no es necesario repetir las dosis para la vacuna COVID-19 ni para la otra vacuna. Los centros de salud deben obtener, documentar y comunicar el historial reciente de vacunas de una persona durante las transferencias entre centros.

Si alguien debe recibir otra vacuna (por ejemplo, influenza) y está programado para una clínica de vacunación COVID-19, la decisión sobre qué vacuna debe administrarse primero debe tomarse en consulta con un médico. Dados los riesgos de la infección por SARS-CoV-2, especialmente en adultos mayores y personas con afecciones de salud subyacentes, se puede recomendar priorizar la serie de vacunas COVID-19 en la mayoría de las situaciones. Sin embargo, deben tenerse en cuenta factores locales, como la co-circulación de la influenza en la comunidad.



Referencias:

1. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html>
2. <https://www.paho.org/en/covid-19-vaccines/frequently-asked-questions-covid-19-vaccines>

Material dirigido al profesional de la salud. Para mayor información comunicarse con el departamento médico, en **Bolivia, Centro América y Caribe:** Sanofi-Aventis de Panamá S.A. Torre Evolution, piso 32 Calle 50 y Av. Aquilino De La Guardia Obarrio-Ciudad de Panamá, República de Panamá Telf.: (507) 382-9500. Sitio web: <http://www.sanofi.com.pa/l/pa/sp/index.jsp>. Correo: infomed.pac@sanofi.com **En Ecuador:** Sanofi-Aventis del Ecuador S.A., Centro Corporativo Ekopark, Vía Antigua a Nayón y Av. Simón Bolívar, torre 2, piso 5, Teléfono 2500-3020. **En Venezuela:** Sanofi Aventis de Venezuela, S.A. Prolongación, calle Vargas con 2da transversal, Urb. Boleíta Norte. Edif. Sanofi, Caracas, Venezuela. Telf.:(Master) (0212) 7189000 RIF. J-30308848-1. En Colombia: TV 23 # 97 73 piso 9 – Bogotá Teléfono (57-1) 6214400. **En Perú:** Av. Javier Prado Este 444 Piso 15, San Isidro Lima-Perú Teléfono (+511) 631-9100 Para reportes de eventos adversos en: **Centro América, Caribe, Bolivia y Ecuador:** drugs.camwi@sanofi.com **Venezuela:** farmacovigilancia.ve@sanofi.com. MAT-BO-2100152 04/21.